

Madex Top SC

Toelatingsnummer	15386 N
Wnr	W.0
Productgroep	Insecticide
Aard van het preparaat	Suspensie concentraat
Werkzame stof(fen) en gehalte(n)	<i>Cydia pomonella</i> granulose virus V15 (CpGV V15) (3,0 * 1013 CpGV V15/L)
Bewaring	Het middel moet in de koelkast (< 5 °C), droog en donker bewaard worden.

Classificatie

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:	
-	
Pictogram	-
Signaalwoord	-
Voorzorgsmaatregelen	P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
Aanvullende etiketelementen	SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

STORL logo

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

Eerstehulpmaatregelen

Eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies: Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Verontreinigde kleding verwijderen.

Na inademen: Rust, frisse lucht, doktershulp. Indien nodig zuurstofbeademing.

Na huidcontact: Verontreinigde kleding verwijderen. Met water en zeep grondig wassen. Bij langdurige huidirritatie de dokter raadplegen. Vervuilde kleding wassen vooraleer opnieuw te gebruiken.

Na contact met de ogen: Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v stromend water grondig spoelen. Indien irriterende effecten optreden, dokter raadplegen.

Na inslikken: Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: Symptomen. Er is geen sterke reactie voor het menselijk lichaam bekend.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling: Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingen versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering middel* per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Pitvruchten	Rupsen van de fruitmot	0,05-0,10 L/ha	10	6

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

Fruitmot (*Cydia pomonella*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Het product bevat *Cydia pomonella* granulose virus. Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

In de teelt van pitvruchten het middel toepassen in 400-1200 liter water per hectare.

Schudden voor gebruik.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof *Cydia pomonella* granulose virus isolaat CpGV-V15. Tegen *Cydia pomonella* granulovirus isolaat CpGV-V15 bestaat kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen. Verder geldt dat om resistentieontwikkeling te voorkomen, Madex Top SC waar mogelijk af te wisselen met middelen op basis van een andere werkzame stof dan *Cydia pomonella* granulovirus isolaat CpGV-V15.

Voor het zogenoemde Mexicaanse isolaat van *Cydia pomonella* (CpGV-M) is enige resistentie vastgesteld. Het nieuwe isolaat V15 (CpGV-V15) kan deze resistentie doorbreken. Tot nu toe is geen resistentie tegen het isolaat V15 van *Cydia pomonella* bekend. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Aanbevelingen

Raadpleeg voor het toepassen uw adviseur en/of leverancier en pas toe volgens goed landbouwkundig gebruik.

Algemeen

Madex Top SC is een biologisch insecticide op basis van het *Cydia pomonella* granulosevirus. Het middel is zeer selectief en werkt tegen de rupsen van de fruitmot.

Product stewardship

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

Toepassing

Een goede bedekking van het blad is essentieel voor een goede werking (vraatmiddel). Eerste toepassing bij het uitkomen van de eerste eieren, 100 ml/ha elke 8 tot 14 dagen.

Menging

Het middel kan gemengd worden met insecticiden en fungiciden (behalve middelen op basis van koper). De pH van de spuitvloeistof mag niet lager zijn dan 5 en niet hoger dan 8,5.

Bewaring

Het middel moet in de koelkast (< 5 °C), droog en donker bewaard worden.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens de gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en /of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.