


# Paraat

<b>Toelatingsnummer</b>	11432 N
<b>Wnr</b>	W.12
<b>Productgroep</b>	Fungicide
<b>Aard van het preparaat</b>	Spuitpoeder
<b>Werkzame stof(fen) en gehalte(n)</b>	Dimethomorf (50%)

## Classificatie

de identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:	
-	
<b>Pictogram</b>	 GHS09
<b>Signaalwoord</b>	-
<b>Gevarenaanduidingen</b>	H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
<b>Voorzorgsmaatregelen</b>	<p>P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.</p> <p>P102 Buiten het bereik van kinderen houden.</p> <p>P273 Voorkom lozing in het milieu.</p> <p>P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.</p> <p>P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar verzamelpunt voor speciaal of gevaarlijk afval. Of geleeqd/gespoeld afvoeren conform STORL.</p>
<b>Aanvullende etiketelementen</b>	<p>SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.</p> <p>EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.</p>

## STORL logo

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

## Eerstehulpmaatregelen

**Algemeen advies:** Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Verontreinigde kleding verwijderen.

**Na inademen:** Rust, frisse lucht.

**Na huidcontact:** Met water en zeep grondig wassen.

**Na contact met de ogen:** Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen.

**Na inslikken:** Mond spoelen en daarna rijkelijk water drinken.

**Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:**

**Behandeling:** behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies).

## Wettelijk gebruiksvorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

### Toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering # middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Aardbei (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling direct na uitplanten of uitleggen	Stengelbasisrot *1	3,0 kg/ha	3,0 kg/ha	1 per 12 maanden	-	35 dagen
Aardbei (bedekte teelt)	Druppelbehandeling direct na uitplanten	Stengelbasisrot *1	0,1 gram, per 100 ml water; per plant 100 ml oplossing	11 kg/ha	1 per teeltcyclus	-	35 dagen

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering # middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Witlof (trekteelt op water)	Toevoegen aan proceswater binnen 24 uur na het opstarten	Wortel- en voetrot *2	0,025% (2,5 gram per 1000 liter water)	0,875 kg/ha	1 per teeltcyclus	-	Toepassen binnen 24 uur na het opstarten van de trek
Potplanten (bedekte teelt)	Aangieten, of via eb/vloed systeem	Wortel-, stengel- en voetrot *3	0,01% (10 gram per 100 liter water; 150 ml oplossing per liter potgrond)	10,26 kg/ha	2 per teeltcyclus	7	-
Snijbloemen m.u.v. roos (op kunstmatig substraat; bedekte teelt)	Druppelbehandeling of aangieten	Wortel-, stengel- en voetrot *4	0,05% (50 gram middel per 100 liter water; per plant 100-250 ml oplossing)	7,5 kg/ha	2 per 12 maanden	10	-
Roos (op kunstmatig substraat; bedekte teelt)	Druppelbehandeling of aangieten	Wortel-, stengel- en voetrot *4	0,05% (50 gram middel per 100 liter water, per plant 100-250 ml oplossing)	8,75 kg/ha	2 per 12 maanden	10	-

# Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

\*1 Stengelbasisrot (*Phytophthora cactorum*)

\*2 Wortel- en voetrot (*Phytophthora cryptogea*)

\*3 Wortel-, stengel- en voetrot *Phytophthora cinnamomi*)

\*4 Wortel-, stengel- en voetrot (*Phytophthora* spp.)

Het gebruik in de teelt van druif, veldsla, opkweek van koolgewassen (bedekte teelt) en veredelingsteelt en basiszaadproductie van spinazie is beoordeeld conform de “vereenvoudigde uitbreidingsprocedure”. Er is/zijn voor deze toepassing/toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied(en), komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Het gebruik in de teelt van braam- en framboosachtigen (*rubus* spp), sla (*Lactuca* spp; bedekte teelt), rucola (bedekte teelt), kruiden (bedekte teelt), onbedekte teelt van peterselie, Lisianthus (bedekte teelt), lelie, Delphinium, Echinops en zonnebloem is op basis van een “derdenuitbreiding”. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied(en), komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Het gebruik in de teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten is beoordeeld op basis van artikel 51 1107/2009. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering # middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Druif (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw *1	0,6 kg /ha	0,6 kg /ha	3 per 12 maanden	1,8 kg/ha per 12 maanden	10	28
Braam- en framboosachtigen ( <i>rubus</i> spp.)	Druppelbehandeling of aangieten	Stengelbasisrot *2	3,0 kg/ha	3,0 kg/ha	1 per 12 maanden	3,0 kg/ha per 12 maanden	-	90
Sla; <i>Lactuca</i> spp. (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw *3	0,03 % (30 gram per 100 liter water)	0,3 kg/ha	2 per teeltcyclus	0,6 kg/ha per teeltcyclus	7	14
Veldsla	Gewasbehandeling	Valse meeldauw *4	0,36 kg/ha	0,36 kg/ha	2 per teeltcyclus	0,72 kg/ha per teeltcyclus	7	14

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering # middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Rucola	Gewasbehandeling	Valse meeldauw *5	0,03 % (30 gram per 100 liter water)	0,3 kg/ha	2 per teeltcyclus	0,6 kg/ha per teeltcyclus	7	14
Koolgewassen (opkweek op substraat; bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw *6	3,0 kg/ha	3,0 kg/ha	4 per 12 maanden	12,0 kg/ha per 12 maanden	7	-
Kruidenteelt (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw *5	0,03 % (30 gram per 100 liter water)	0,3 kg/ha	2 per teeltcyclus	0,6 kg/ha per teeltcyclus	7	14
Peterselie (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw *5	0,03 % (30 gram per 100 liter water)	0,3 kg/ha	2 per teeltcyclus	0,6 kg/ha per teeltcyclus	7	14
Lisianthus (bedekte teelt)	Aangieten	Wortel-, stengel- en voetrot *2	0,05% (50 gram per 100 liter water; per plant 100-250 ml oplossing)	3,0 kg/ha	2 per 12 maanden	6,0 kg/ha per 12 maanden	10	-
Lelie (bedekte snijbloementeelt)	Aangieten	Wortel-, stengel- en voetrot *2	0,05% (50 gram per 100 liter water)	3,0 kg/ha	2 per 12 maanden	6,0 kg/ha per 12 maanden	7	-
Lelie (onbedekte snijbloementeelt)	Aangieten	Wortel-, stengel- en voetrot *2	0,05% (50 gram per 100 liter water)	0,5 kg/ha	2 per 12 maanden	1,0 kg/ha per 12 maanden	7	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering # middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids- termijn in dagen
Delphinium	Aangieten	Wortel-, stengel- en voetrot *2	0,05% (50 gram per 100 liter water)	3,0 kg/ha	1 per 12 maanden	3,0 kg/ha per 12 maanden	-	-
Echinops	Aangieten	Wortel-, stengel- en voetrot *2	0,05% (50 gram per 100 liter water)	3,0 kg/ha	1 per 12 maanden	3,0 kg/ha per 12 maanden	-	-
Zonnebloem (sierteelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw *7	0,03% (30 gram per 100 liter water)	0,3 kg/ha	2 per 12 maanden	0,6 kg/ha per 12 maanden	7	-
Boomkwekerij- gewassen (onbedekte teelt)	Aangieten	Wortel-, stengel- en voetrot *2	0,05% (50 gram per 100 liter water)	3,0 kg/ha	1 per 12 maanden	3,0 kg/ha per 12 maanden	-	-
	Gewasbehandeling	Valse meeldauw *9 Taksterfte *11	0,03% (30 gram per 100 liter water)	0,3 kg/ha	3 per 12 maanden		10	-
Boomkwekerij- gewassen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw *9 Taksterfte *11	0,03% (30 gram per 100 liter water)	0,3 kg/ha	3 per 12 maanden	0,9 kg/ha per 12 maanden	10	-
Vaste planten	Gewasbehandeling	Valse meeldauw *9, *10 Taksterfte *11	0,03% (30 gram per 100 liter water)	0,3 kg/ha	3 per 12 maanden	0,9 kg/ha per 12 maanden	7	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering # middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Veredelingsteelt en basiszaadproductie van spinazie	Gewasbehandeling	Valse meeldauw *8	0,36 kg/ha	0,36 kg/ha	2 per teeltcyclus	0,72 kg/ha per teeltcyclus	14	-

# Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

- \*1 Valse meeldauw (*Plasmopara viticola*)
- \*2 Wortel-, stengel- en voetrot / stengelbasisrot (*Phytophthora* spp.)
- \*3 Valse meeldauw (*Bremia lactuceae*)
- \*4 Valse meeldauw (*Peronospora valerianellae*)
- \*5 Valse meeldauw (*Plasmopara* spp.)
- \*6 Valse meeldauw (*Peronospora parasitica*)
- \*7 Valse meeldauw (*Plasmopara halstedii*)
- \*8 Valse meeldauw (*Peronospora farinosa*)
- \*9 Valse meeldauw (*Peronospora* spp.)
- \*10 Valse meeldauw (*Plasmopara* spp.)
- \*11 Taksterfte (*Phytophthora* spp.)

#### Overige toepassingsvoorwaarden

Draag geschikte handschoenen tijdens het mengen en laden.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van op- en zijwaarts bespoten boomkwekerijgewassen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik gemaakt wordt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90.

Om de zoogdieren te beschermen is toepassing in de teelt van druiven uitsluitend toegestaan vanaf BBCH 53, wanneer de bloei zichtbaar is.

Het middel is gevaarlijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.

Om residuen boven de MRL in volggewassen te voorkomen, is een wachttermijn vereist van tenminste 120 dagen tussen laatste toepassing en zaaien of planten. Dit geldt voor alle volggewassen waarvoor een MRL lager dan 0,05 mg/kg geldt, met uitzondering van granen, waarvoor geen wachttermijn is vereist.

Om residuen boven de MRL in volggewassen te voorkomen, kan na het gebruik van Paraat als druppelbehandeling op aardbeien geen voedings- of voedergewas geteeld worden.

Met Paraat behandelde zonnebloemen mogen niet voor humane of dierlijke consumptie worden aangewend.

Voor alle gewassen geldt dat indien nog geen ervaring is opgedaan met het middel, een proefbehandeling uitgevoerd dient te worden teneinde de verdraagzaamheid van het gewas of variëteit te testen.

#### **Aanbevelingen**

Raadpleeg voor het toepassen uw adviseur en/of leverancier en pas toe volgens goed landbouwkundig gebruik.

#### **Algemeen**

##### **Product stewardship**

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op [www.toolboxwater.nl](http://www.toolboxwater.nl). Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

##### **Re-entry**

Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens de gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en /of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.