


Stomp 400 SC

| | |
|---|-------------------------|
| Toelatingsnummer | 10766 N |
| Wnr | W.24 |
| Productgroep | Herbicide |
| Aard van het preparaat | Suspensie concentraat |
| Werkzame stof(fen) en gehalte(n) | Pendimethalin (400 g/l) |

Classificatie

| | |
|---|--|
| De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: - | |
| Pictogram |  |
| Signaalwoord | WAARSCHUWING |
| Gevarenaanduidingen | H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| Voorzorgsmaatregelen | P273 Voorkom lozing in het milieu. P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar verzamelpunt voor speciaal of gevaarlijk afval. Of geleeqd/gespoeld afvoeren conform STORL. |
| Aanvullende etiketelementen | SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. EUH208 Bevat pendimethalin. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. |

STORL logo

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

Eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies: Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Verontreinigde kleding verwijderen.

Na inademen: Rust, frisse lucht.

Na huidcontact: Met water en zeep grondig wassen.

Na contact met de ogen: Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen.

Na inslikken: Mond spoelen en daarna rijkelijk water drinken.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies).

Wettelijk gebruiksvorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

| Toepassingsgebied | Type toepassing | Te bestrijden organisme | Dosering (middel) per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus | Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus | Minimum interval tussen toepassingen in dagen |
|---------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| Consumptieaardappel | Voor-opkomst | Eenjarige onkruiden | 2,5 l/ha *1 | 1 | 2,5 l/ha | - |
| Wintergraan | Na-opkomst | Eenjarige onkruiden | 3,25 l/ha | 1 | 3,25 l/ha | - |
| Granen | Voor-opkomst | Eenjarige onkruiden | 3,25 l/ha | 1 | | - |

| Toepassingsgebied | Type toepassing | Te bestrijden organisme | Dosering (middel) per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus | Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus | Minimum interval tussen toepassingen in dagen |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| Maïs | Voor-opkomst | Eenjarige onkruiden | 4,0 l/ha ¹ | 1 | 4,0 l/ha | - |
| | Na-opkomst | Eenjarige onkruiden | 2,5 l/ha-4,0 l/ha *1 | 1 | | - |
| Peulvruchten (m.u.v. sojaboon) | Voor-opkomst | Eenjarige onkruiden | 2,5-3,25l/ha *3 | 1 | 3,25 l/ha | - |
| Teunisbloem | Voor-opkomst | Eenjarige onkruiden | 2,5-3,25 l/ha *3 | 1 | 3,25 l/ha | - |
| Veldboon (voedergewas) | Voor-opkomst | Eenjarige onkruiden | 2,5-3,25l/ha *3 | 1 | 3,25 l/ha | - |
| Wortelen | Voor-opkomst | Eenjarige onkruiden | 2,0 l/ha | 1 | 2,0 l/ha | - |
| Uien *2 | Voor-opkomst | Eenjarige onkruiden | 2,5-3,25 l/ha *3 | 1 | 3,25 l/ha | - |
| | Voor opkomst | Eenjarige onkruiden | 0,75-1,0 l/ha *4 | 2 | | 7 |
| | Na-opkomst | Eenjarige onkruiden | 1,25-2,5 l/ha | 2 | | 7 |
| | Na opkomst | Eenjarige onkruiden | 0,5 l/ha *4 | 3 | | 7 |
| Sjalotten | Voor-opkomst | Eenjarige onkruiden | 2,5-3,25 l/ha | 1 | 3,25 l/ha | - |
| | Voor opkomst | Eenjarige onkruiden | 0,75-1,0 l/ha *4 | 2 | | 7 |
| | Na-opkomst | Eenjarige onkruiden | 1,25-2,5 l/ha | 2 | | 7 |

| Toepassingsgebied | Type toepassing | Te bestrijden organisme | Dosering (middel) per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus | Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus | Minimum interval tussen toepassingen in dagen |
|---|-----------------|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | Na opkomst | Eenjarige onkruiden | 0,5 l/ha*4 | 3 | | 7 |
| Prei (onbedekte teelt) | Voor-opkomst | Eenjarige onkruiden | 2,0 l/ha | 1 | 2,0 l/ha | - |
| | Na-planten | Eenjarige onkruiden | 2,5 l/ha | 1 | 2,5 l/ha | - |
| Bieslook (onbedekte teelt) | Voor-opkomst | Eenjarige onkruiden | 2,5 -3,25 l/ha *3 | 1 | 3,25 l/ha | - |
| Bloembollen en bloemknollen (onbedekte teelt) | Voor-opkomst | Eenjarige onkruiden | 4,0 l/ha | 1 | 4,0 l/ha | - |

*1 In combinatie met toegelaten middelen

*2 In zilveruien alleen voor opkomst toepassen

*3 De dosering is afhankelijk van de grondsoort

*4 In een Laag Dosering Systeem in combinatie met toegelaten middelen; 1,0 l/ha + 0,75 l/ha voor opkomst en 0,5 + 0,5 +0,5 l/ha na opkomst

Het gebruik in de teelt van raketblad, cichorei, meekrap, aspergeplantgoed en aromatische kruidgewassen (voor opkomst, met uitzondering van bieslook) is op basis van een “derdenuitbreiding”. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Het gebruik in de teelt van aconitum, astilbe, hosta en pioenroos is beoordeeld conform de “vereenvoudigde uitbreidingsprocedure”. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebied(en), komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Het gebruik in de teelt van lupine, boerenkool, pastinaak, knolselderij, schorseneer, bosuien, knoflook, bleekselderij, rabarber, knolvenkel, aromatische en medicinale kruidgewassen (na opkomst) en medicinale wortelgewassen (onbedekte teelt) is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze

toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

| Toepassingsgebied | Type toepassing | Te bestrijden organisme | Dosering (middel) per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden | Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus | Minimum interval tussen toepassingen in dagen | Veiligheidsstermijn in dagen |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| Lupine (groenbemester) | Voor opkomst | Eenjarige onkruiden | 2,5-3,25 l/ha *3 | 1 per teeltcyclus | 3,25 l/ha | - | - |
| Lupine voor levensmiddelen en diervoeding | Voor opkomst | Eenjarige onkruiden | 2,5-3,25 l/ha *3 | 1 per teelt-cyclus | 3,25 l/ha | - | - |
| Raketblad | Voor opkomst | Eenjarige onkruiden | 1,0 l/ha | 1 per teeltcyclus | 1,0 l/ha | - | - |
| | Na opkomst | Eenjarige onkruiden | 1,0 l/ha | 1 per teeltcyclus | | - | - |
| Cichorei | Na opkomst | Eenjarige onkruiden | 0,5 l/ha | 4 per teeltcyclus | 2,0 l/ha | 7 | - |
| Meekrap | Na planten | Eenjarige onkruiden | 2,0 l/ha | 2 per teeltcyclus | 4,0 l/ha | 14 | - |
| | Voorjaarstoepassing | Eenjarige onkruiden | 2,0 l/ha | 2 per teeltcyclus | | 14 | - |
| Boerenkool | Na planten | Eenjarige onkruiden | 2,6 l/ha | 1 per 12 maanden | 2,6 l/ha | - | - |
| Pastinaak | Voor opkomst | Eenjarige onkruiden | 2,0 l/ha | 1 per teeltcyclus | 2,0 l/ha | - | - |
| Knolselderij | Na planten | Eenjarige onkruiden | 2,0 l/ha | 1 per teeltcyclus | 2,0 l/ha | - | - |

| Toepassingsgebied | Type toepassing | Te bestrijden organisme | Dosering (middel) per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden | Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus | Minimum interval tussen toepassingen in dagen | Veiligheidsstermijn in dagen |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| Schorseneer | Voor opkomst | Eenjarige onkruiden | 2,0 l/ha | 1 per teeltcyclus | 2,0 l/ha | - | - |
| Bosuien | Voor opkomst | Eenjarige onkruiden | 2,0 l/ha | 1 per teeltcyclus | 2,0 l/ha | - | - |
| | Na planten | Eenjarige onkruiden | 2,5 l/ha | 1 per teeltcyclus | 2,5 l/ha | - | - |
| Knoflook | Voor opkomst | Eenjarige onkruiden | 2,5-3,25 l/ha *3 | 1 per teeltcyclus | 3,25 l/ha | - | - |
| | Na opkomst | Eenjarige onkruiden | 1,25-2,5 l/ha | 2 per teeltcyclus | | 7 | - |
| Aspergeplantgoed (onbedekte teelt) | Na planten | Eenjarige onkruiden | 2,0 l/ha | 2 per 12 maanden | 4,0 l/ha | 14 | - |
| | Voorjaarstoepassing | Eenjarige onkruiden | 2,0 l/ha | 2 per 12 maanden | | 14 | - |
| Bleekselderij (onbedekte teelt) | Na planten | Eenjarige onkruiden | 2,0 l/ha | 1 per teeltcyclus | 2,0 l/ha | - | - |
| Rabarber (onbedekte teelt) | Voor opkomst | Eenjarige onkruiden | 2,0 l/ha | 1 per teeltcyclus | 2,0 l/ha | - | - |
| Knolvenkel | Na planten | Eenjarige onkruiden | 2,0 l/ha | 1 per teeltcyclus | 2,0 l/ha | - | - |
| Aromatische kruidgewassen (m.u.v. bieslook) (onbedekte teelt) | Voor opkomst | Eenjarige onkruiden | 2,0 l/ha | 1 per teeltcyclus | 2,0 l/ha | - | - |

| Toepassingsgebied | Type toepassing | Te bestrijden organisme | Dosering (middel) per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden | Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus | Minimum interval tussen toepassingen in dagen | Veiligheidsstermijn in dagen |
|---|-----------------|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| Aromatische kruidgewassen (onbedekte teelt) | Na opkomst | | | | | - | 42 |
| Medicinale kruidgewassen | Na opkomst | Eenjarige onkruiden | 2,0 l/ha | 1 per teeltcyclus | 2,0 l/ha | - | - |
| Medicinale wortelgewassen (onbedekte teelt) | Voor opkomst | Eenjarige onkruiden | 2,0 l/ha | 1 per teeltcyclus | 2,0 l/ha | - | - |
| Aconitum | Voor opkomst | Eenjarige onkruiden | 3,25 l/ha | 1 per 12 maanden | 3,25 l/ha | - | - |
| Astilbe | Voor opkomst | Eenjarige onkruiden | 3,25 l/ha | 1 per 12 maanden | 3,25 l/ha | - | - |
| Hosta | Voor opkomst | Eenjarige onkruiden | 3,25 l/ha | 1 per 12 maanden | 3,25 l/ha | - | - |
| Pioenroos | Voor opkomst | Eenjarige onkruiden | 3,25 l/ha | 1 per 12 maanden | 3,25 l/ha | - | - |

*3 De dosering is afhankelijk van de grondsoort

Toepassingsvoorwaarden

In de teelt van boerenkool Stomp 400 SC toepassen in 500 liter water per ha.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen, is toepassing in de teelt van bloembollen en bloemknollen uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90.

Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in alle teelten met uitzondering van raketblad op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90, waarbij in de teelt van

BASF Nederland B.V., Agricultural Solutions
 Postbus 1019, 6801 MC Arnhem
 Tel. 026-3717171 www.agro.basf.nl

consumptieaardappel, wortelen, uien, prei, bloembollen en bloemknollen, schorseneer en aspergeplantgoed een teeltvrije zone van tenminste 150 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot dient te worden aangehouden.

Voor de teelt van cichorei, raketblad, meekrap, asperge en knoflook geldt bovendien dat op percelen die grenzen aan oppervlaktewater maximaal 1 toepassing per seizoen is toegestaan.

Mislukken teelt

Bij het mislukken van een teelt wordt afgeraden in hetzelfde jaar, afhankelijk van de dosering, zaaidiepte en periode tussen toepassing van Stomp 400 SC en zaai van het vervangewas, bieten, uien en grassen als vervangewas te zaaien.

Gewasveiligheid

Om schade aan gewassen te voorkomen mag het middel niet in aanraking komen met zaden. Er moet voldoende diep gezaaid worden, waarbij de zaden goed bedekt moeten zijn met grond. Het gebruik van het middel op gronden met meer dan 35% afslibbaar wordt daarom afgeraden.

Na de toepassing van Stomp 400 SC kunnen er geen grassen als ondervrucht worden gezaaid.

Voor de teelt van prei en zilverui kan onder bepaalde omstandigheden, met name in geval van trage ontwikkeling, enige geelverkleuring of groeivertraging van het gewas optreden. Dit leidt over het algemeen niet tot opbrengstderving.

Aanbevelingen

Raadpleeg voor het toepassen uw adviseur en/of leverancier en pas toe volgens goed landbouwkundig gebruik.

Product stewardship

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

Wanneer in de directe omgeving gewassen staan die in de komende dagen of weken kunnen worden geoogst, dient men de goede landbouwpraktijken zorgvuldig toe te passen in verband met deze naburige gewassen. Drift naar deze gewassen dient altijd vermeden te worden. Eventuele afspraken tussen beide partijen kunnen hiervoor nuttig zijn.

Algemeen

Stomp 400 SC is een bodemherbicide, dat werkzaam is tegen éénjarige grasachtige en tweezaadlobbigen onkruiden.

Het middel is goed werkzaam tegen duist, windhalm, straatgras en hanenpoot. Groene naalदार en vingergrassen zijn minder gevoelig. Bijna alle belangrijke tweezaadlobbige akkeronkruiden zijn gevoelig met uitzondering van korenbloem, knopkruid, klein kruiskruid en wikkesoorten.

Voor een optimale werking is een voldoende vochtige en bezakte grond tijdens en na de toepassing noodzakelijk. Op droge grond en bij droge omstandigheden na de toepassing kan de werking tegenvallen. Op grondsoorten met meer dan 10% humus kan de werking tegenvallen.

Re-entry

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

Gewassen

Consumptieaardappelen

Toepassen ruim voor opkomst van de aardappelen na het aanaarden, in een tankmenging met een daarvoor toegelaten herbicide.

Wintergraan

Toepassen direct na het zaaien op onkruidvrije grond of kort na opkomst.

Tarwe, gerst, rogge, haver, triticale en spelt

Toepassen direct na het zaaien op onkruidvrije grond.

Maïs

Toepassen direct na het zaaien tot aan het tweebladstadium van de maïs. Het middel dient voor een voldoende brede werking in combinatie met een andere herbicide te worden toegepast.

- a. 4,0 l/ha middel per ha toegepast direct na zaai, gevolgd door een bespuiting na opkomst met een daarvoor toegelaten herbicide;
- b. 2,5 – 4,0 l/ha in combinatie met een daartoe toegelaten herbicide toegepast kort na opkomst van de maïs op jong onkruid.

Peulvruchten (m.u.v. sojaboon) en veldboon (voedergewas)

Toepassen direct of kort na het zaaien op onkruidvrije grond.

Dosering: 2,5 l/ha op gronden met minder dan 30% afslibbaar of 5% humus.
3,25 l/ha op gronden met meer dan 30% afslibbaar of 5% humus.

Teunisbloem

Toepassen direct of kort na het zaaien op onkruidvrije grond.

Dosering: 2,5 l/ha op gronden met minder dan 30% afslibbaar of 5% humus.
3,25 l/ha op gronden met meer dan 30% afslibbaar of 5% humus.

Wortelen

Toepassen direct of kort na het zaaien.

Uien en sjalotten exclusief zilverui

Toepassen voor opkomst, direct of kort na zaaien, op onkruidvrije grond.

Toepassen na opkomst vanaf het kramstadium. Een gedeelde toepassing heeft de voorkeur.

Zilverui

Toepassen voor opkomst, direct of kort na het zaaien, op onkruidvrije grond.

Plantprei

Toepassen kort na het planten op onkruidvrije grond.

Zaaiprei

Toepassen direct na of kort na het zaaien op onkruidvrije grond.

Bieslook

Toepassen direct of kort na het zaaien op onkruidvrije grond.

Dosering: 2,5 l/ha op gronden met minder dan 30% afslibbaar of 5% humus.
3,25 l/ha op gronden met meer dan 30% afslibbaar of 5% humus.

Bloembollen en bloemknollen

Toepassen voor opkomst van de bollen op onkruidvrije grond.

In bloembol- en bloemknolgewassen, waarin nog geen ervaring is opgedaan, eerst een proefbespuiting uitvoeren.

Boerenkool

Bij het gebruik van dit product in boerenkool is schade aan het gewas niet uit te sluiten.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens de gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en /of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.