

Nemasys® Outdoor

Biologisch product ter bestrijding van o.a. bonenvlieg (*Delia platura*), (Californische trips (*Frankliniella occidentalis*) en uienvlieg (*Delia antiqua*)).

Inhoud: 90% insectenparasitaire aaltjes, 10% inerte ingrediënten en water

Nemasys® Outdoor is een biologisch product. Het bevat de insectenparasitaire aaltjes *Steinernema feltiae*. De aaltjes zoeken na toediening actief naar de prooi en dringen deze binnen via de natuurlijke openingen, waardoor de prooi wordt gedood. Nemasys® Outdoor is volledig veilig voor de mens, het milieu, het gewas en nuttige insecten.

Aanbevolen aaltjesdosering

Plaag	Toepassing	Type toepassing	Dosering	Tray 1 miljard	Tray 5 miljard	Interval dagen
Trips	Bodem	Zaai-/ plantrij	1.200.000.000 /ha	0,8 ha	4 ha	5 – 7
		Volvelds	2.500.000.000 /ha	0,4 ha	2 ha	5 – 7
Uienenvlieg		Volvelds	2.500.000.000 /ha	0,4 ha	2 ha	5 – 7
Bonenvlieg		Zaai-/ plantrij	1.000.000.000 /ha	1 ha	5 ha	5 – 7
		Volvelds	2.500.000.000 /ha	0,4 ha	2 ha	5 – 7
Trips	Blad	Volvelds	2.500.000.000 /ha	0,4 ha	2 ha	5 – 7

Bereiding spuitvloeistof

- Leeg de inhoud van een tray in een emmer met 10 l water en roer de oplossing goed door.
- Gebruik de gehele tray in één keer.
- Vul het spuitvat of de spuitank van driekwart van de benodigde spuitoplossing en voeg vervolgens de aaltjesoplossing toe.
- Het spuitvat / de spuitank afvullen met de benodigde hoeveelheid water.
- De aaltjesoplossing direct na het aanmaken toepassen.

Toepassing

- De toepassing kan worden uitgevoerd met de gebruikelijke spuitapparatuur.
- Verwijder alle filters kleiner dan 0,3 mm (300 micron).
- De pompdruk mag niet hoger zijn dan 20 bar/2000 kPa.
- Tijdens de toepassing de spuitvloeistof continu roeren om bezinking van de aaltjes te voorkomen.
- Gebruik een spuitdop van 0,5 mm (500 micron) of groter.
- De spuitvloeistof kan niet worden bewaard.

Aanbevelingen

- Zorg voor vochtige omstandigheden tijdens de toepassing.
- Niet toepassen bij zonnig weer.
- (Bodem)temperatuur tussen 10 – 30 °C.
- Zorg ervoor dat bij een bodemtoepassing de aaltjes in het bovenste gedeelte van de toplaag terechtkomen.
- Zorg bij een bladtoepassing voor voldoende bladbedekking maar voorkom afdrup.
- Houdt bij een bladtoepassing een bladnatperiode van minimaal 2 uur aan.
- Aaltjes kunnen samen met verschillende gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast; voor informatie over tankmixen, raadpleeg uw distributeur of kijk op: www.nemasys.nl.

Opslag

- Verwijder bij ontvangst direct de (overdoos) verpakking.
- Koel bewaren (2 – 5 °C), niet invriezen.
- Zorg voor een goede luchtcirculatie rond de tray's.
- Zie verpakking voor de uiterste gebruiksdatum.

Kwaliteitsgarantie

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.

BASF Nederland B.V.
Divisie Agro
Postbus 1019
6801 MC ARNHEM
Tel. 026 - 3717171

® = Geregistreerd handelsmerk van BASF

81180278NL2124

