

Tanaris

GROEP	15(K3)	4(O)	HERBICIDE
-------	--------	------	-----------


Toelatingsnummer	15090 N
Wnr	W.1
Productgroep	herbicide
Aard van het preparaat	Suspo-emulsie
Werkzame stof(fen) en gehalte(n)	dimethenamide-p (333 g/L) + quinmerac (167 g/L)
UFI	KYS3-M04J-8005-QW1M

Classificatie

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:

dimethenamide-p

Pictogram



Signaalwoord

WAARSCHUWING

Gevarenaanduidingen

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Draag beschermende handschoenen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar erkende verwerker van afvalstromen.

Aanvullende etiketelementen	SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
------------------------------------	--

STORL

Lege, schone en droge verpakking kan bij STORL worden ingeleverd.

Eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies: Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Verontreinigde kleding verwijderen.

Na inademen: Rust, frisse lucht, doktershulp.

Na huidcontact: Met water en zeep grondig wassen.

Na contact met de ogen: 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, door oogarts laten controleren.

Na inslikken: Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings-gebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering #1 middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bieten	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden Hanepoot *1	0,3-0,6 L/ha #2	3	1,5 L/ha	7
Winterkoolzaad	Voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5 l/ha	1	1,5 l/ha	-
	Na opkomst	onkruiden	1,5 l/ha	1		-

Toepassings- gebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering #1 middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen

#1 Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

#2 In LDS-systeem: Eerste toepassing voor 3^e blad stadium (BBCH 13) met 0,3 L/ha, tweede en derde toepassing voor 9^e blad stadium (BBCH19) met 0,6 L/ha.

*1 Hanepoot (*Echinochloa crus-galli*)

Toepassingsvoorwaarden

In de teelt van bieten het middel toepassen in 100 tot 300 liter water per ha.

Om het grondwater te beschermen mag dit product in de teelt van bieten niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden in de periode van 1 september tot 1 maart.

In de teelt van winterkoolzaad het middel toepassen voor de kieming van de zaden (BBCH 00 tot 03) of na het twee blad stadium (BBCH 12 tot 18).

Bij het mislukken van de teelt kan na 15 cm diep ploegen en 4 maanden na toepassing van het middel tarwe, gerst, haver, zomerkoolzaad, maïs, erwten en bonen worden gezaaid.

Behandelde voederbieten binnen 110 dagen na toepassing niet vervoederen.

Vermijd drift naar naburige gewassen. Met name pas ingezaaid gras is gevoelig.

LET OP: het valt in de teelt van bieten niet uit te sluiten dat tijdelijke verkleuring van het blad kan optreden. Dit leidt in het algemeen niet tot opbrengstderving.

Aanbevelingen

Raadpleeg voor het toepassen uw adviseur en/of leverancier en pas toe volgens goed landbouwkundig gebruik.

Product stewardship

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

Re-entry

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van beschermende maatregelen.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens de gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en /of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.