

Soriale

GROEP

P07 (U33)

FUNGICIDE

Toelatingsnummer	15707 N
Wnr	W.4
Productgroep	Fungicide
Aard van het preparaat	Met water mengbaar concentraat
Werkzame stof(fen) en gehalte(n)	kaliumfosfonaten (755 g/l)

Classificatie

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:	
-	
Pictogram	-
Signaalwoord	-
Gevarenaanduidingen	-
Voorzorgsmaatregelen	P273 Voorkom lozing in het milieu. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar erkende verwerker van afvalstromen
Aanvullende etiketelementen	SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

STORL

Lege, schone en droge verpakking kan bij STORL worden ingeleverd.

Eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies: Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Hulpverleners moeten aan eigen veiligheid denken. Bij gevaar van bewusteloosheid, plaatsing en transport in stabiele zijligging. Verontreinigde kleding verwijderen.

Na inademen: Rust en frisse lucht.

Na huidcontact: Met water en zeep grondig wassen.

Na contact met de ogen: Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen.

Na inslikken: Mond spoelen en vervolgens veel water drinken.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies).

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering# middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Pitvruchten	Schurft *1	1,86 L/ha	6	5	35

Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

*1 Schurft (*Venturia spp.*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in de onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering # middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte teelt)	Valse meeldauw *9	0,125% (125 ml in 100 L water)	1,86 L/ha	2 per teeltcyclus, 4 per 12 maanden	7	1
Tomaat (bedekte teelt)	Tomatenziekte *10	0,125% (125 ml in 100 L water)	1,86 L/ha	2 per teeltcyclus	7	1
Aubergine (bedekte teelt)	Grauwe schimmel *11	0,125% (125 ml in 100 L water)	1,86 L/ha	2 per teeltcyclus	7	1
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp (onbedekte teelt)	Vuur *2	1,86 L/ha	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	14	-
Aalbes (onbedekte teelt)	Bladvalziekte *6 Roest *7	1,86 L/ha	1,86 L/ha	2 per 12 maanden voor de oogst	7	14
				1 per 12 maanden na de oogst	-	-
Kruisbes (onbedekte teelt)	Bladvalziekte *6 Roest *7	1,86 L/ha	1,86 L/ha	2 per 12 maanden voor de oogst	7	14
				1 per 12 maanden na de oogst	-	-
Blauwe bes (onbedekte teelt)	Twijgkanker *8	1,86 L/ha	1,86L/ha	2 per 12 maanden voor de oogst	7	14
				1 per 12 maanden na de oogst	-	-
Bloembollen en bloemknollen (bedekte teelt)	Vuur *2	1,86 L/ha	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	5	-
Bolbloemen en knolbloemen (onbedekte teelt)	Vuur *2	1,86 L/ha	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	14	-
Bolbloemen en knolbloemen	Vuur *2	1,86 L/ha	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	5	-

(bedekte teelt)						
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Echte meeldauw *3	1,86 L/ha	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	17	-
Potplanten (bedekte teelt)	Echte meeldauw *3	1,86 L/ha	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	5	-
Snijbloemen (bedekte teelt, grondgebonden)	Echte meeldauw *3	1,86 L/ha	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	5	-
Snijbloemen (bedekte teelt, niet- grondgebonden)	Echte meeldauw *3	1,86 L/ha	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	5	-
Trekheester (bedekte teelt)	Echte meeldauw *3	1,86 L/ha	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	5	-
Snijgroen (bedekte teelt)	Echte meeldauw *3	1,86 L/ha	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	5	-
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	Echte meeldauw *3	1,86 L/ha	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	5	-
Boomkwekerij (pot en containerteelt) (onbedekte teelt)	Echte meeldauw *3	1,86 L/ha	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	17	-
Boomkwekerij (pot en containerteelt) (bedekte teelt)	Echte meeldauw *3	1,86 L/ha	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	5	-
Laanbomen (onbedekte teelt)	Echte meeldauw *3	1,86 L/ha	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	17	-
Klimplanten (onbedekte teelt)	Echte meeldauw *3	1,86 L/ha	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	17	-
Coniferen incl. kerstbomen (onbedekte teelt)	Echte meeldauw *3	1,86 L/ha	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	17	-
Sierheesters incl. rozen (onbedekte teelt)	Echte meeldauw *3	1,86 L/ha	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	17	-
Heide soorten (onbedekte teelt)	Echte meeldauw *3	1,86 L/ha	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	17	-
Bos- en haagplantsoen	Echte meeldauw *3	1,86 L/ha	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	17	-

(onbedekte teelt)						
Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)	Echte meeldauw *3	1,86 L/ha	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	5	-
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Echte meeldauw *3	1,86 L/ha	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	17	-
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)	Echte meeldauw *3	1,86 L/ha	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	5	-
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	Echte meeldauw *3	1,86 L/ha	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	17	-
Bloemenzaadteelt (bedekte teelt)	Echte meeldauw *3	1,86 L/ha	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	5	-
Veredeling en zaadteelt m.u.v. aardappel, maïs, granen, graszaadteelt, hop en olifantsgras (bedekte teelt)	Echte meeldauw *3	1,86 L/ha	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	5	-

Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

*2 Vuur (*Botrytis* spp)

*3 Echte meeldauw (*Erysiphe* spp, *Microsphaera* spp, *Oidium* spp, *Sphaerotheca* spp)

*6 Bladvalziekte (*Drepanopeziza ribis*)

*7 Roest (*Cronartium ribicola*)

*8 Twijgkanker (*Diaporthe vaccinii*)

*9 Valse meeldauw (*Pseudoperonospora cubensis*)

*10 Tomatenziekte (*Phytophthora infestans*)

*11 Grauwe schimmel (*Botryotinia fuckeliana*)

Het gebruik in de onbedekte teelt van tulp en lelie is beoordeeld conform de "vereenvoudigde uitbreidingsprocedure". Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering# middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Lelie (onbedekte teelt)	Vuur *4	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	14
Tulp (onbedekte teelt)	Vuur *5	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	14

Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

*4 Vuur (*Botrytis elliptica*)

*5 Vuur (*Botrytis tulipae*)

Overige toepassingsvoorwaarden

In de bedekte teelt van potplanten, snijbloemen, trekheesters en snijgroen het middel toepassen in 200-1200 liter water.

In de bedekte teelt van vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare schil, tomaat en aubergine het middel toepassen in 100-1488 liter water.

In de teelt van pitvruchten het middel alleen toepassen vanaf BBCH 53, (het openen van de knoppen (uitbotten) waarbij de bloemen nog omhuld zijn door de groene blaadjes) tot begin van het afrijpen (BBCH 81).

Werkzaamheid tegen schurft op fruit kan onvoldoende zijn, aangeraden wordt om het middel toe te passen in tankmix met toegelaten middelen.

Effecten op de fermentatie zijn niet beoordeeld.

Het middel kan een mogelijk effect hebben op de smaak van verwerkte peren.

Aanbevelingen

Raadpleeg voor het toepassen uw adviseur en/of leverancier en pas toe volgens goed landbouwkundig gebruik.

Product stewardship

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

Re-entry

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van beschermende maatregelen.

Mengbaarheid

Soriale is niet mengbaar met stikstofhoudende meststoffen.

Soriale mag niet worden gemengd met minerale oliën of producten op basis van carbonaat, bicarbonaat of zink.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens de gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en /of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.