



Corum

Toelatingsnummer	14591 N
Wnr	W.2
Productgroep	herbicide
Aard van het preparaat	Met water mengbaar concentraat
Werkzame stof(fen) en gehalte(n)	bentazon (480 g/l) + imazamox (22,4 g/l)

Classificatie

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: bentazon	
Pictogram	  <small>GHS07 GHS09</small>
Signaalwoord	WAARSCHUWING
Gevarenaanduidingen	H302 Schadelijk bij inslikken. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen	P264 Na het werken met dit product met veel water en zeep grondig wassen. P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P273 Voorkom lozing in het milieu. P301 + P312 NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een arts raadplegen. P330 De mond spoelen. P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
Aanvullende etiketelementen	SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. EUH208 Bevat bentazon. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

STORL logo

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

Eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies: Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Verontreinigde kleding verwijderen.

Na inademen: Rust, frisse lucht, doktershulp.

Na huidcontact: Met water en zeep grondig wassen.

Na contact met de ogen: Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen.

Na inslikken: Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van na opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Peulvruchten	Breedbladige onkruiden	1,25 l/ha	1	1,25 l/ha	-
		0,625 l/ha	2		7
Veldboon (voedergewas)	Breedbladige onkruiden	1,25 l/ha	1	1,25 l/ha	-
		0,625 l/ha	2		7
Boon met peul (onbedekte teelt)	Breedbladige onkruiden	1,25 l/ha	1	1,25 l/ha	-
		0,625 l/ha	2		7
Boon zonder peul		1,25 l/ha	1	1,25 l/ha	-

Toepassings- gebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
	Breedbladige onkruiden	0,625 l/ha	2		7
Erwt met peul (onbedekte teelt)	Breedbladige onkruiden	1,25 l/ha	1	1,25 l/ha	-
		0,625 l/ha	2		7
Erwt zonder peul	Breedbladige onkruiden	1,25 l/ha	1	1,25 l/ha	-
		0,625 l/ha	2		7

Toepassingsvoorwaarden

-

Aanbevelingen

Raadpleeg voor het toepassen uw adviseur en/of leverancier en pas toe volgens goed landbouwkundig gebruik.

Product stewardship

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

Algemeen

Spuit op een droog gewas. Temperaturen boven de 12 °C alsmede zonlicht bevorderen de werking. Ook het gebruik van een uitvloeier bevordert de werking.

Re-entry

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

Gewassen

Peulvruchten

Pas Corum toe in het 2^e-3^e samengestelde bladstadium van het gewas.

Veldboon (voedergewas)

Pas Corum toe in het 1^e drietalligbladstadium van het gewas.

Boon met peul

Pas Corum toe in het 1^e drietalligbladstadium van het gewas.

Erwt met peul

Pas Corum toe in het 2^e-3^e samengestelde bladstadium van het gewas.

Erwt zonder peul

Pas Corum toe in het 2^e-3^e samengestelde bladstadium van het gewas.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens de gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en /of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.